

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Vartoti paruoštas tirpalas 18,7 ml paketėliuose, kuriuose yra 10 g makrogolio 4000 (PEG).

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šią medicinos priemonę, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką. Jeigu šalutinis poveikis pasunkėjo arba pasireiškė bet koks šalutinis poveikis, nenurodytas šiame lapelyje, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Jeigu per savaitę Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Apie ką rašoma šiame lapelyje:

- 1. Kas yra ForlaxGO® ir kam ji vartojama**
- 2. Kas žinotina prieš vartojant ForlaxGO®**
- 3. Kaip vartoti ForlaxGO®**
- 4. Galimas ForlaxGO® šalutinis poveikis**
- 5. Kaip laikyti ForlaxGO®**
- 6. Pakuotės turinys ir kita informacija**

1. Kas yra ForlaxGO® ir kam ji vartojama

ForlaxGO® yra medicinos priemonė, vartojama simptominiams nereguliaraus vidurių užkietėjimo gydymui suaugusiesiems ir vaikams nuo 8-erių metų.

Tai yra paruoštas vartoti geriamasis tirpalas, tiekiamas vienkartinuose paketėliuose.

Pagrindinė sudedamoji ForlaxGO® dalis yra makrogolis 4000, osmosinio poveikio vidurius laisvinanti medžiaga, taip pat vadinama polietilenglikoliu (PEG).

Makrogolis 4000 sulaiko vandenį išmatose. Todėl kietos išmatos suminkštėja ir padidėja jų tūris, o tai pagreitina jų slinkimą žarnynu ir palengvina tuštinimąsi bei suteikia palengvėjimo pojūtį. Makrogolis 4000 nėra organizmo įsisavinamas, jis pašalinamas nepakitusiu pavidalu.

ForlaxGO® vartojama suaugusiųjų ir vaikų nuo 8-erių metų:

- vidurių užkietėjimui palengvinti,
- kietoms išmatoms suminkštinti ir palengvinti tuštinimąsi.

Jeigu per savaitę Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

2. Kas žinotina prieš vartojant ForlaxGO®

ForlaxGO® vartoti negalima:

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) makrogoliui 4000 (polietilenglikoliui ar PEG) arba bet kuriai kitai sudedamajai medžiagai (žr. 6 skyrių „Pakuotės turinys ir kita informacija“);
- Jeigu sergate sunkia virškinimo trakto liga, pvz.:
 - Uždegiminė žarnų liga (pvz., opiniu kolitu, Krono liga) ar esant nenormaliai išsiplėtusiai storajai žarnai (toksinė didelė gaubtinė žarna (megacolon))
 - Virškinimo trakto perforacija (skylė žarnos sienelėje) ar jos išsivystymo rizika
 - Esamas ar įtariamas žarnų nepraeinamumas (žarnų nepraeinamumas arba įtariama žarnų obstrukcija ar jos simptomai)
 - Neaiškios priežasties pilvo skausmas

Nevartokite šios medicinos priemonės esant bent vienai iš šių būsenų.

Jei abejojate, prieš vartodami ForlaxGO® pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Įspėjimai dėl šios medicinos priemonės ir atsargumo priemonės:

Nutraukite ForlaxGO® vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu Jums pasireiškia šie simptomai:

- alerginės reakcijos, pvz., bėrimas ar veido, liežuvio arba gerklės patinimas (angioneurozinė edema), dilgėlinė;
- silpnumas, kolapsas ar sunkumas kvėpuoti bei prasta bendra savijauta.

Prieš vartodami šią medicinos priemonę, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jei:

- esate senyvo amžiaus,
- Jums yra sutrikusi kepenų ar inkstų funkcija,
- vartojate diuretikus (šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus), nes tuomet galima natrio (druskos) ar kalio kiekio sumažėjimo kraujyje rizika.

Jei pasireiškė viduriavimas, nevartokite ForlaxGO®, gerkite daug skysčių ir pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Prieš pradėdami vartoti ForlaxGO®, reikia atmesti organinio sutrikimo galimybę, kaip ir prieš vartojant bet kurią kitą vidurius laisvinančią priemonę.

ForlaxGO® negalima vartoti kasdien ilgą laiką, nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties. Jei pilvo skausmas tęsiasi, pasitarkite su gydytoju.

Naudojimas vaikams:

Šios medicinos priemonės negalima vartoti jaunesniems kaip 8-erių metų vaikams.

Dėl vartojimo 8-12 metų amžiaus vaikams rekomenduojama pasitarti su gydytoju.

Kiti vaistai ir ForlaxGO®:

ForlaxGO® gali daryti įtaką kitų tuo pat metu vartojamų preparatų absorbcijai. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigyjamus be recepto, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui, nes ForlaxGO® vartojimo metu jie gali būti ne tokie veiksmingi.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis:

ForlaxGO® galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

Tačiau, jei esate nėščia, mėginate pastoti arba žindote, prieš ForlaxGO®

forlaxGO®

Suaugusiesiems ir vaikams nuo 8-erių metų

vartojimą rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Informacija apie kai kurias ForlaxGO® sudėtyje esančias medžiagas:

ForlaxGO® sudėtyje nėra cukraus, dėl to galima vartoti diabetikams.

ForlaxGO® sudėtyje nėra natrio, dėl to galima vartoti laikantis sumažinto natrio kiekio dietos.

3. Kaip vartoti ForlaxGO®

Vartojimo metodas:

- ForlaxGO® yra paruošta vartoti, paketėlio turinį galima išgerti iškart iš paketėlio arba užsigeriant stikline vandens.
- ForlaxGO® rekomenduojama gerti kartą per parą, ryte.
- Kiekvieną paketėlį galima naudoti tik kartą, iškart atidarius.

Dozavimo rekomendacijos:

ForlaxGO® pradeda veikti per 24 – 48 valandas

Rekomenduojama dozė	- Suaugusieji: 1-2 paketėliai per parą - vaikai nuo 8-erių metų: pradžioje po 1 paketėlį kas antrą parą, iki 2 paketėlių per parą. Paros dozė galima koreguoti atsižvelgiant į poveikį.
Gydymo trukmė	- Negalima vartoti ilgiau kaip 15 dienų

ForlaxGO® turi būti vartojamas kartu taikant sveiką gyvenimo būdą ir dietą. Šią medicinos priemonę visada vartokite tiksliai, kaip nurodyta šiame lapelyje. Jei abejojate, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Ką daryti pavartojus daugiau ForlaxGO® nei reikėjo:

Pavartojus daugiau ForlaxGO®, gali atsirasti viduriavimas, pilvo skausmas ar vėmimas. Šie simptomai paprastai išnyksta, kai gydymas sustabdomas arba sumažinama dozė.

Sunkus viduriavimas ar vėmimas gali sukelti dehidraciją (ypač senyvo amžiaus žmonėms). Turite nedelsiant apie tai pasakyti gydytojui, nes gali prireikti gydymo.

Pamiršus pavartoti ForlaxGO®:

Suvaldykite praleistą dozę. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

4. Galimas šalutinis ForlaxGO® poveikis

Dauguma šalutinio poveikio reiškinių yra lengvi ir praeinantys.

Dažniausiai buvo pranešta apie pilvo skausmą, pūtimą, viduriavimą, dėl kurio gali skaudėti išangės sritį, ir pykinimą.

Kitas nedažnas šalutinis poveikis buvo vėmimas, staigus noras tuštintis, išmatų nelaikymas, mažas natrio ar kalio kiekis kraujyje.

Nutraukite ForlaxGO® vartojimą ir nedelsiant praneškite gydytojui apie alergines (padidėjusio jautrumo) reakcijas, pvz., odos išbėrimą ar paraudimą, niežulį ar dilgėlinę arba sunkią alerginę reakciją, dėl kurios gali pasireikšti alpimas, kolapsas, sunkumas kvėpuoti ar veido, lūpų, liežuvio arba gerklės tinimas (angioneurozinė edema).

5. Kaip laikyti ForlaxGO®

ForlaxGO® rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje, apsaugotą nuo karščio ir šviesos.

Medicinos priemonę laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

ForlaxGO® nevartokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės ar paketėlio.

Tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Nevartokite, jei paketėlis pažeistas.

Medicinos priemonės negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingas medicinos priemones, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kiekviename 18,7 ml paketėlyje yra 10 g makrogolio 4000.

Kitos sudedamosios dalys:

Aviečių skoninė medžiaga*, natrio karboksimetilceliuliozė, bevandenė citrinų rūgštis, kalio sorbatas, sukralozė, vanduo.

*aviečių skoninės medžiagos sudėtis: 93,7 % propilenglikolio (E1520), 0,1 % acto rūgšties (E260), kvapiosios medžiagos.

Gamintojas:

IPSEN Consumer HealthCare

65 quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt, Prancūzija

Vietinis atstovas:

Ipsen Pharma Lietuvos filialas

T. Narbuto g. 5, 08105, Vilnius, Lietuva

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2019 m. vasario mėn.

Simboliai:

